

CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD PARA DENGUE

DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA (DSSA)

Persona que vive o ha viajado en los 14 días a zonas con transmisión de dengue y presenta fiebre habitualmente de 2 a 7 días de evolución y 2 ó más de las siguientes manifestaciones:

1. Náuseas / vómitos.
2. Exantema.
3. Cefalea / dolor retroorbitario.
4. Mialgia / artralgia.
5. Petequias o prueba del torniquete (+).
6. Leucopenia.

**Primer nivel
Manejo ambulatorio**

DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA (DCSA)

Todo caso de dengue que cerca de y preferentemente a la caída de la fiebre presenta uno o más de los siguientes signos:

1. Dolor abdominal intenso y sostenido, o dolor a la palpación del abdomen.
2. Vómitos persistentes.
3. Acumulación de líquidos.
4. Sangrado de mucosas.
5. Letargo / irritabilidad.
6. Hipotensión postural (lipotimia).
7. Hepatomegalia >2 cm.
8. Aumento progresivo del hematocrito.

Internar en Hospital o unidades de dengue

DENGUE GRAVE (DG)

Todo caso de dengue que tiene una o más de las siguientes manifestaciones:

1. Choque o dificultad respiratoria debido a extravasación grave de plasma.
2. Sangrado grave: según la evaluación del médico tratante.
3. Compromiso grave de órganos (daño hepático, miocarditis, etc.)

Hospitalizar UCI

Requieren monitoreo estricto e intervención médica inmediata

GRUPOS DE INTERVENCIÓN PARA EL MANEJO CLÍNICO DE LOS CASOS DENGUE

| | Grupo A | Grupo B 1 | Grupo B 2 | Grupo C |
|----------------------------------|---|--|--|--|
| CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD | Dengue sin signos de alarma (DSSA) | Dengue sin signos de alarma (DSSA) | Dengue con signos de alarma (DCSA) | Dengue Grave (DG) |
| CRITERIOS DE GRUPO | <p>Toleran volúmenes adecuados de líquidos por vía oral.</p> <p>Orinan al menos una vez cada 6 horas.</p> <p>Sin enfermedades ni condiciones asociadas, ni riesgo social.</p> | <p>Presentan enfermedad o condiciones asociadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embarazo • ≤ 1 año • ≥ 65 años • Obesidad mórbida • Hipertensión arterial • Diabetes mellitus • Asma • Daño renal • Enfermedades hemolíticas • Hepatopatía crónica • Enfermedad úlcero péptica o gastritis de cualquier etiología. • En tratamiento con anticoagulantes. • Entre otras <p style="text-align: center;">o</p> <p>Presentan riesgo social:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El paciente vive solo o lejos de donde puede recibir atención médica. • Vive en pobreza extrema. | <p>Pacientes que, cercanos a la caída de la fiebre o más frecuentemente a la caída de la fiebre o en las horas siguientes, presenten uno o más de los siguientes signos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen. 2. Vómitos persistentes. 3. Acumulación de líquidos 4. Sangrado de mucosas. 5. Letargo / irritabilidad. 6. Hipotensión postural (lipotimia) 7. Hepatomegalia > 2 cm 8. Aumento progresivo del hematocrito. | <p>Todo caso de dengue que tiene una o más de las siguientes manifestaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Choque o dificultad respiratoria debido a extravasación grave de plasma. • Sangrado grave: según la evaluación del médico tratante. • Compromiso grave de órganos (daño hepático, miocarditis, etc.) |
| NIVEL DE ATENCIÓN PARA EL MANEJO | <p>Nivel primario.</p> <p>Tratamiento en el hogar.</p> | <p>Posible remisión a hospital o unidades de dengue.</p> <p>Requiere observación y atención de su infección y condición asociada.</p> | <p>Hospital o unidades de dengue.</p> <p>Requiere administración de líquidos.</p> | <p>Unidad de Cuidados Intensivos.</p> <p>Requiere tratamiento de Urgencia.</p> |

ALGORITMO DE ATENCIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE DENGUE EN MENORES DE EDAD

