


CICLO DE TRANSMISIÓN DE LA ESQUISTOSOMIASIS



La forma más común de infectarse es a través del baño en lagos, esteros y arroyos infestados por los caracoles de dos ombligos, reservorios de la enfermedad.



TESÁI HA TEKÓ
PORÁVE
Motonodcha
Ministerio de
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

SÍNTOMAS DE LA ESQUISTOSOMIASIS



Erupciones en la piel
Fiebre
Malestar general
Dolor de cabeza
Dolor abdominal

La forma más común de infectarse es a través del baño en lagos, esteros y arroyos infestados por los caracoles de dos ombligos, reservorios de la enfermedad.



TESÁI HA TEKÓ
PORÁVE
Motenondécha
Ministerio de
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

FORMAS DE PREVENIR LA ESQUISTOSOMIASIS



No ingrese a aguas desconocidas

Evite el uso de letrinas secas y procure la construcción de un pozo ciego en la casa



Hierva el agua para todo uso como mínimo 2 minutos

La forma más común de infectarse es a través del baño en lagos, esteros y arroyos infestados por los caracoles de dos ombligos, reservorios de la enfermedad.



TESÁI HA TEKO
PORÁVE
Motenondcha
Ministerio de
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente